




# Avertissements agricoles

(R)  
BRETAGNE

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

280, rue de Fougères, 35000 RENNES ☎ (99) 36 01 74



Publication périodique

BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

ÉDITION : CULTURES MARAÎCHÈRES, LÉGUMIÈRES ET POMMES DE TERRE

BULLETIN "CULTURES MARAÎCHÈRES, LÉGUMIÈRES ET  
POMMES DE TERRE" N° 112

29 JUILLET 1985

- POMMES DE TERRE : Attention au Mildiou tardif.
- CHOUX : Mouche, chenilles, pucerons.
- POIREAUX : Intervenez contre le "ver".
- HARICOTS : Maladies et pucerons.
- TOMATES DE PLEIN AIR : Protégez-les du Mildiou.

## POMMES DE TERRE DE CONSERVATION

### - MILDIOU

La situation sanitaire a peu évolué depuis le précédent bulletin : le développement du mildiou demeure limité. Toutefois, le retour des pluies risque d'entraîner un redémarrage de la maladie. Intervenez préventivement avec un produit de contact ou un produit pénétrant sur les pommes de terre qui ne seront pas défanées d'ici une semaine.

### - DORYPHORES

Des dégâts sont enregistrés par foyers dans de nombreuses parcelles. En présence de larves, intervenez **obligatoirement** avec un anti doryphores. S'il y a aussi des pucerons, utilisez Sumicidin ou Décis B.

## CHOUX

Avant plantation, protégez vos jeunes plants contre le ver de la mouche du chou. Trempez les racines 10 minutes dans une solution renfermant l'une des spécialités suivantes, pour 10 litres d'eau :

Birlane CE 40 : 0,5 l

Phytosol 50 : 0,2 l

Des chenilles de teigne et de piéride apparaissent en culture. En leur présence, intervenez avec Decis ou Orthène 50, également efficaces contre le puceron cendré.

*P.1...24*

## POIREAUX

Des dégâts de "vers du poireau" consécutifs au second vol de la Teigne sont observés sur les parcelles non protégées. Une nouvelle intervention est conseillée.

## HARICOTS

### - MALADIES

Les pluies orageuses favorisent l'installation des pourritures dues au Botrytis et au Sclerotinia.

Pour prévenir les attaques de ces maladies, effectuez un traitement au début de la floraison avec vinchlozoline (Ronilan : 1,5 kg/ha) ou procymidone (Sumisclex 1,5 kg/ha).

### - PUCERONS

On observe ces insectes dans certaines parcelles. Surveillez vos cultures et intervenez, si nécessaire, avec un insecticide autorisé sur cultures légumières.

## TOMATES DE PLEIN AIR

### - MILDIU

A la suite des pluies de ces jours-ci, le mildiou risque d'apparaître. Effectuez un premier traitement en utilisant l'un des produits suivants :

captafol (Difosan , Orthodifolatan)

chlorothalonil (Daconil)

cuivre seul ou associé à un autre fongicide (bouillie bordelaise, UC 70...)

cymoxanil associé à un autre fongicide (Fulvax, Remiltine, Sygan ...)

manèbe (nombreuses spécialités)

mancozèbe (Dithane M 45, Sandozèbe ...)

En cas de lessivage par les pluies (20 à 25 mm), renouvelez le traitement.

### - PUCERONS

En présence de pucerons, ajoutez un insecticide autorisé sur cultures légumières.

## ECHALOTES

Pour éviter le développement de pourritures en cours de conservation, récoltez et stockez séparément les zones touchées par la pourriture blanche (Sclerotium cepivorum). Eliminez les bulbes atteints.